

Aussaatmengen, Aussaatzeitpunkte, Saatmengen und Erträge wichtiger Ackerkulturen*

Kultur	Saatmenge in kg/ha	Reihenweite in cm	Saattiefe in cm	Saatzeitpunkt Dekade/Monat	Erntezeitpunkt	Ertrag in t/ha-Mittel	Bemerkung
Hafer	90-140	10-15	3-5	I/3-I/4	I/8-II/8	3,5-5,0	
Sommergerste	120-200	10-15	2-4	I/III-II/4	III/7-II/8	3,5-5,0	
Wintergerste	110-180	10-15	2-4	I/9-III/9	III/6-II/7	4,0-6,0	
Winterweizen	120-200	10-15	3-4	II/10-II/11	I/7-I/8	3,5-6,0	
Durum	140-220	10-15	2-3	II/2-II/3	II/7-II/8	3,0-4,0	
Winterroggen	90-160	10-15	1-3	II/9-III/10	III/7-II/8	3,5-5,5	
Körnermais	15-35	65-75	4-8	II/4-I/5	I/10-III/11	6,0-10,0	1,2
Silomais (FM)	20-40	50-65	4-8	II/4-I/5	III/-III/10	40-50	3
Winterraps	3-4	10-15	1-2	II/8-I/9	III/6-I/8	2,0-3,5	
Erbсен	180-260	10-28	4-7	III/2-III/3	II/8-I/9	2,5-4,5	
Sojabohne	80-120	15-50	3-7	II/4-I/5	III/9-II/10	1,5-2,5	1
Sonnenblume	4-6	45-75	3-5	I/5-II/5	I/9-III/9	2,0-3,5	1
Zuckerrübe	ca.4	45-65	2-4	III/3-III/4	I/10-I/12	45-60	1
Kartoffel	2000-3000	62-75	4-8	II/3-II/5	III/9	20-35	5
Sorghumhirse	9-16	40-70	2-4	III/4-II/5	III/9-III/10	4,0-6,0	1,6, 7, 8
Rispenhirse	12-21	10-30	1-3	III/4-I/6	III/8-I/9	3,5-4,0	
Kümmel	8-10	20-28	0,5-1	II/3-I/4	II/7-I/8	1,1-1,6	4

Bemerkungen:

- 1 ausreichende Temperatursumme notwendig
- 2 Pflanzendichte: 70.000-95.000 Pflanzen/ha; Packungseinheiten zu je 50.000 Körnern
- 3 Pflanzendichte: 80.000-110.000 Pflanzen in Packungseinheiten zu je 50.000 Körnern
- 4 meist als Untersaat
- 5 Varietäten von Früh- bis Stärkekartoffeln
6. für Trockenstandorte geeignet
- 7 in Österreich werden nur frühe Sorten angebaut
- 8 Körner werden geerntet, keine Silage

*aus ÖKL (2003): Kursunterlage „Crashkurs“. Tagungsunterlagen Ackertag 2003. Wien.